

МІЛУПА БЕЙСІК П

ОБ'ЄМ: 400 г (g) e

ОПИС

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: Мілупа Бейсік П / Milupa Basic P для дієтотерапії порушень амінокислотного або білкового обміну від народження (наприклад, органічних ацидурій, порушень циклу сечовини) або при обмежувальних дієтах, коли потрібна додаткова енергія і мікроелементи.

Підходить для дітей грудного та раннього віку.

Порошкоподібна формула без білка, що містить вуглеводи, жири, вітаміни, мінерали та мікроелементи. Не підходить в якості єдиного джерела живлення. Без доданого білка.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем. Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! **Застосовувати тільки під наглядом лікаря!** Не можна використовувати як єдине джерело харчування. Не є лікарським засобом.

Запобіжні заходи: продукт не повинен використовуватися в якості єдиного джерела білка, необхідно застосовувати у поєднанні з природним білком, наприклад, грудним молоком або спеціальною дитячою сумішшю, з метою забезпечення потреб дитини у всіх необхідних амінокислотах, рідині та основних поживних речовинах у визначених лікарем кількостях.

Сухі суміші не є стерильними. Дитячу суміш слід готувати безпосередньо перед годуванням. Не кип'ятити і не використовувати мікрохвильову піч для приготування або розігрівання продукту. У свіжоприготовані суміші можна додавати відповідне джерело білка або амінокислот. Для збагачення поживними речовинами порошок можна додавати в різні страви.

ВИРОБНИК

Мілупа ГмБХ, Шлейерштрассе, 4, м. Фүльда, 36041, Німеччина

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна, тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Строк споживання узгоджується з лікарем

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Запакований продукт зберігати у сухому і прохолодному місці (від + 5 °C до +25 °C) та відносній вологості повітря не більше ніж 75%. Завжди закривайте банку кришкою після використання. Після відкриття закрийте упаковку, зберігайте в сухому прохолодному місці (не в холодильнику) і використовуйте протягом одного місяця. Суміш, що залишилася в пляшечці через 1 годину після годування, слід викинути.

ФОРМА ВИПУСКУ

Порошкоподібна суміш в металевій банці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

15 місяців



РЕКОМЕНДОВАНЕ СПОЖИВАННЯ

Добова порція продукту, кількість та пропорції розведення визначаються лише лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров'я дитини. Добову норму слід регулярно коригувати під наглядом лікаря.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

Здоров'я вашої дитини залежить від дотримання правил приготування та використання продукту. Порушення способу приготування може завдати шкоди вашій дитині.

Використовуйте тільки мірну ложку, що входить в комплекті з банкою в упаковці. Вага мірної ложки: 4,4 г (g)

РЕКОМЕНДОВАНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ

Кожна мірна ложка (4,4 г (g)) Мілупа Бейсік П розводиться в 30 мл (ml) води для отримання рекомендованої концентрації (13,2 об.%, тобто 13,2 г (g) продукту на 100 мл (ml) води). Осмолярність в цій концентрації складає 140 мОсоль/л (mOsmol/l). Одночасно слід давати воду або додаткову рідину, щоб забезпечити надходження достатньої кількості рідини.

ІНСТРУКЦІЯ З ПРИГОТУВАННЯ ДЛЯ ГОДУВАННЯ З ПЛЯШЕЧКИ

на 100 мл (ml) суміші: 87 мл (ml) води температурою 40 °C (переважно) + 3 мірні ложки порошку

1. Ретельно вимийте руки, використовуйте чистий або стерилізований посуд і стежте за чистотою верхньої частини упаковки.

2. Прокип'ятіть чисту питну воду впродовж 5 хвилин або поки електричний чайник не вимкнеться. Почекайте, поки вода охолоне (щонайменше 30 хвилин) приблизно до +40 °C, капніть краплю на зап'ястя для перевірки температури. Налийте необхідну кількість води в стерилізовану пляшечку для годування.

3. Наповніть мірну ложку порошком, зніміть надлишки суміші за допомогою тильної сторони чистого ножа. Не слід притискати порошок в мірну ложку. Використовуйте тільки мірну ложку, що входить в комплекті з банкою.

4. Додайте рекомендовану кількість мірних ложок суміші у приготовану воду. Закрийте кришку на пляшечці та добре збовтайте її до повного розчинення порошку. Якщо потрібно, додайте відповідне джерело білка або амінокислот до свіжоприготованого продукту, знову струшуйте. Перед годуванням перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (+37 °C).

5. Використовуйте відразу після приготування суміші. Будь-яка суміш в пляшці, що залишилася після години годування, повинна бути викинута. Суміш не повинна повторно розігріватись під час годування. Не слід давати суміш в якості заохочення під час годування.

Для приготування зондового харчування дотримуйтесь порад вашого лікаря або дієтолога щодо гігієнічного приготування та обробки суміші, включаючи стерилізацію обладнання та використання кип'яченої, охолодженої води.

ІНСТРУКЦІЯ З ПРИГОТУВАННЯ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗОНД

на 100 мл (ml) суміші

1. Використовуйте надану мірну ложку або зважте призначену кількість порошку.

2. Додайте невелику кількість необхідної води до призначеної кількості порошку і перемішуйте виделкою до отримання однорідної пасти.

3. Продовжуйте перемішувати, додаючи решту води, поки не досягнете потрібного розведення.

ІНСТРУКЦІЯ З ПРИГОТУВАННЯ ДЛЯ ГОДУВАННЯ З ЧАШКИ/ПИТТЯ

Вимийте руки та використовуйте чисте обладнання. Дотримуйтесь інструкцій з приготування 1–3 для зондового харчування або додайте призначену кількість порошку до виміряного об'єму води, накрийте кришкою і струшуйте, поки порошок не розчиниться. Використовуйте кип'ячену, охолоджену воду або свіжу воду залежно від віку та медичного стану.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩОДО ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Тривалий або частий контакт напоїв та їжі із зубами збільшує ризик карієсу, тому якісна гігієна ротової порожнини важлива для дітей грудного та раннього віку.

Слідкуйте за першими зубками малюка, особливо перед сном. При необхідності проконсультуйтеся з Вашим лікарем-педіатром або стоматологом.

СКЛАД

Мальтодекстрин, рослинні олії (пальмова, рапсова, кокосова, соняшникова), гідрофосфат кальцію, емульгатор (складні ефіри моно- та дигліцеридів жирних кислот лимонної кислоти), хлорид калію, регулятор кислотності (лимонна кислота), карбонат натрію, карбонат калію, карбонат кальцію, бітарtrat холіну, карбонат магнію, інозитол, L-сорбінова кислота, сульфат заліза, антиоксидант аскорбілпальмітат, сульфат цинку, L-карнітин, ретинілацетат, нікотинамід, D-пантотенат кальцію, сульфат міді, рибофлавін, мононітрат тіаміну, піридоксину гідрохлорид, DL-α-токоферилацетат, сульфат марганцю, йодид калію, хлорид хронію, фолієва кислота, молібдат натрію, селеніт натрію, фіторенадіон, D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

	Одиниці	На 100 г (g)	на 100 мл (ml) / 13,2 г (g) порошку
Енергетична цінність	кДж (kJ)/ ккал (kcal)	2217/ 531	293/ 70
Жири, з них:	г (g)	31,3	4,1
Насичені	г (g)	14,1	1,9
Вуглеводи, з них:	г (g)	62,2	8,2
Цукри	г (g)	5,6	0,73
Харчові волокна	г (g)	0,0	0,00
Білки	г (g)	<0,10	<0,01
Сіль	г (g)	0,44	0,06

Мінеральні речовини	Одиниці	На 100 г (g)	На 100 мл (ml)/ 13,2 г (g) порошку
Натрій	mg (мг)	174	23,0
Калій	mg (мг)	455	60,1
Хлориди	mg (мг)	303	40,0
Кальцій	mg (мг)	456	60,2
Фосфор	mg (мг)	258	34,1
Магній	mg (мг)	41,8	5,52
Залізо	mg (мг)	7,59	1,00
Мідь	mg (мг)	0,38	0,050
Цинк	mg (мг)	3,80	0,50
Марганець	mg (мг)	0,053	0,007
Йод	µg (мкг)	60,8	8,03
Молібден	µg (мкг)	19,0	2,51
Селен	µg (мкг)	12,1	1,60
Хром	µg (мкг)	15,2	2,01

Інші	Одиниці	На 100 г (g)	На 100 мл (ml)/ 13,2 г (g) порошку
L-карнітин	mg (mg)	7,80	1,03
Холін	mg (mg)	91,1	12,0
Інозитол	mg (mg)	98,7	13,0

Вітаміни	Одиниці	На 100 г (g)	на 100 мл (ml) / 13,2 г (g) порошку
Вітамін А	мкг RE (µg RE)	570	75,2
Вітамін D3	мкг (µg)	9,49	1,25
Вітамін Е	мг α-TE (mg α-TE)	4,42	0,58
α-токоферол	мг (mg)	4,60	0,61
Вітамін С	мг (mg)	63,6	8,40
Вітамін К	мкг (µg)	22,8	3,01
Тіамін	мг (mg)	0,46	0,06
Рибофлавін	мг (mg)	0,76	0,10
Ніацин (преформований)	мг (mg)	4,56	0,60
Ніацин (включаючи триптофан)	мг NE (mg NE)	4,56	0,60
Вітамін В6	мг (mg)	0,34	0,04
Фолієва кислота	мкг (µg)	53,2	7,02
Фолат	мкг (µg)	90,4	11,9
Вітамін В12	мкг (µg)	0,91	0,12
Біотин	мкг (µg)	13,7	1,81
Пантотенова кислота	мг (mg)	2,66	0,35

*при розведенні 13,2 г (g) / 100 мл (ml), тобто 3 мірні ложки + 87 мл (ml) води