

NUTRILON БІЛКОВА ДОБАВКА

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ

50 x 1 г (g) саше

Маса нетто: 50 г (g) e

ОПИС

«Nutrilon Білкова добавка»

Дитяче харчування для спеціальних медичних цілей.

Дитяче харчування для спеціальних медичних цілей «Nutrilon білкова добавка» для вигодовування екстремально недоношених дітей з масою тіла до 1000 г (г) від народження. Від народження. Комплексне рішення для недоношених: Передчасне народження. Використовувати тільки в умовах стаціонару і за призначенням під контролем лікаря. 50 x 1 г (г) саше. Для вигодовування екстремально недоношених дітей з масою тіла до 1000 г (г).

Nutrilon Білкова добавка призначена для індивідуального забезпечення білкових потреб недоношених дітей з масою тіла до 1000 г (г) що додається до грудного молока або до суміші для передчасно народжених малюків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовувати за призначенням і під контролем лікаря. Не може використовуватися як єдине джерело харчування. Не для парентерального харчування. Використовувати тільки в умовах стаціонару. Недотримання рекомендацій з дозування може зашкодити здоров'ю дитини. Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем. Забороняється використання води з колодязів і каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Не залишайте дитину на самоті під час годування.

ВИРОБНИК

Nutricia Cuijk B.V., Schuttersweg 12, 5443 PR, Naps, the Netherlands (ТОВ «Нутриція Кайк», вул. Схюттерсвег, 12, с. Хапс, 5443 PR, Нідерланди). Вироблено в ЄС.

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна, тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці

ЯК ЗБЕРІГАТИ

Продукт в оригінальній упаковці зберігати у сухому і прохолодному місці при температурі від 0° до 25 °С та відносній вологості не більше 75%.

Відкриті саше не використовувати для наступного приготування суміші.

Перед використанням ознайомтеся з детальною інструкцією з використання.

Упаковано в захисному середовищі.



ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

«Nutrilon білкова добавка» призначена для індивідуального забезпечення білкових потреб недоношених дітей з масою тіла до 1000 g (г), що додається до грудного молока або до суміші для передчасно народжених малюків.

ПОТРЕБА В БІЛКУ

Для екстремально недоношених дітей з масою < 1000 g (г), відповідно до рекомендацій ESPGHAN 2010 р.¹, ентеральне споживання білка має становити 3,6 - 4,1 g (г) /100 ккал (4,0 - 4,5 (g) г/ kg (кг)/добу).

ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ГРУДНЕ МОЛОКО

Якщо існує така можливість, визначте вміст білка у грудному молоці та додайте необхідну кількість мультикомпонентного збагачувача грудного молока. Потім додайте відповідну кількість білкової добавки, щоб забезпечити добове споживання білка на рівні 4,0-4,5 g (г)/kg (кг)/добу (3,6-4,1 g (г)/100 kcal (ккал)).

ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ МОЛОЧНА СУМІШ NUTRILON ПЕРЕДЧАСНИЙ ДОГЛЯД

Одна порція суміші Nutrilon Передчасний догляд містить 3,3 g (г) білка/100 kcal (ккал) (2,7 g (г)/100 ml (мл)). Щоб забезпечити рівень споживання білка, що відповідає рекомендаціям ESPGHAN, до кожних 100 мл молочної суміші Nutrilon Передчасний догляд додають 0,3-0,9 g (г) білкової добавки залежно від розрахованої потреби немовляти у білках.

Адекватність споживання білка рекомендується контролювати, визначаючи вміст азоту сечовини у сироватці крові.

РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ

Необхідно брати до уваги кількість білка, яка вже міститься у грудному молоці або суміші. Щоб збільшити вміст білка у продукті харчування на 1 g (г), необхідно додати до нього 1,2 g (г) білкової добавки.

ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- 1) Вимийте руки і простерилізуйте посуд, переконайтеся, що упаковка чиста.
- 2) Зважте рекомендовану кількість порошку на вагах, дотримуючись вимог чистоти і стерильності й уникаючи ризику будь-якого забруднення.
- 3) Додайте рекомендовану кількість порошку у підготовлену молочну суміш або збагачене грудне молоко.
- 4) Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення добавки.
- 5) Перевірте температуру готової суміші перед використанням.
Готуйте тільки одну порцію для кожного окремого годування та використайте її протягом 2 годин.

Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції.

Безкоштовна консультація педіатра на

Лінії підтримки батьків NUTRICIA

0 800 50 17 85

(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

¹Agostoni et al. Enteral Nutrient Supply for Preterm Infants. Commentary from the European Paediatric Society of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee of Nutrition. JPGN 2010;50:1-9 (ESPGHAN - Європейське товариство педіатричної гастроентерології, гепатології та нутриціології).

СКЛАД

Глибокий гідролізат сироваткового білка (**з молока**), глибокий гідролізат казеїну (**з молока**). Без ГМО. Не містить глютену.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

	Одиниці	100 g(г) продукту
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	1436/ 338
Жири , з них:	g (г)	0,1
Насичені	g (г)	0,7
Вуглеводи , з них:	g (г)	2,2
Цукри	g (г)	2,2
Лактоза	g (г)	1,34
Харчові волокна	g (г)	0,0
Білок	g (г)	82,1
Казеїн	g (г)	41,1
Сироватковий білок	g (г)	41,1
Сіль*	g (г)	1,9
Мінеральні речовини		

*Зумовлено вмістом натрію природного походження.