

ІНФАТРІНІ ПЕПТІСОРБ

ВІД НАРОДЖЕННЯ

ОБ'ЄМ: 200 ml (мл) Є

ОПИС

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування Інфатріні Пептісорб / Infatrini Peptisorb. **Запаковано в захисному середовищі.**

Ультрапастеризований продукт.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш рідка, повноцінна, готова до вживання, для дієтотерапії при захворюваннях, пов'язаних з мальнутрицією і відставанням фізичного розвитку у дітей від народження до 18 місяців або масою тіла до 9 kg (кг) з мальабсорбцією та/або мальнутрицією (нутритивною недостатністю). Високоенергетична суміш на основі глибокого гідролізату сироваткового білка. Для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 kg (кг) з затримкою фізичного розвитку, підвищеними енергетичними потребами та/або з обмеженнями споживання рідини, з харчовою непереносимістю та з харчовою алергією. Для годування з пляшечки або через зонд.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Застосовувати тільки під наглядом лікаря, після повного розгляду всіх варіантів годування, включаючи грудне вигодовування. Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Може застосовуватись як єдине джерело харчування для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 kg (кг). Не є лікарським засобом.

МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ «КРАЩЕ СПОЖИТИ ДО» (ДАТА ТА НОМЕР ПАРТІЇ):

Вказано на пляшці збоку.

ВИРОБНИК

«Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер / «N.V. Nutricia», Eerste Stationsstraat 186, 2712 НМ Zoetermeer, The Netherlands.

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні).

ДОЗУВАННЯ

Має визначатися лікарем.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Строк споживання узгоджується з лікарем

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після першого відкриття закрити пляшечку та зберігати в холодильнику не більше 24 годин, за умови що продукт не споживали безпосередньо із пляшечки.

ФОРМА ВИПУСКУ

Рідка суміш у пластиковій пляшечці 200 ml (мл) Є.



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вимийте руки, використовуйте чистий або стерилізований посуд. Перед застосуванням добре збовтати. Перелийте суміш у стерилізовану пляшечку для годування або в контейнер для годування через зонд. Застосовувати суміш кімнатної температури або підігріти до +37 °С. Не використовуйте мікрохвильову піч для розігріву. Завжди перевіряйте температуру суміші перед застосуванням.

Пероральне застосування: після застосування суміш, що залишилася у пляшці, з якої годували, необхідно вилити.

При годуванні через зонд: час введення через зонд не може перевищувати 4 годин. Невикористану суміш слід вилити та не використовувати повторно.

СКЛАД

Демінералізована вода, глюкозний сироп, мальтодекстрин, рослинні олії (середньоланцюгові тригліцериди (з кокосової та/або пальмової олії), кукурудзяна, рапсова, соняшникова), гідролізований білок з сироватки **(з коров'ячого молока)**, емульгатор (лимоннокислі ефіри моно- та дигліцеридів жирних кислот), гідроортофосфат калію, **риб'ячий жир**, хлорид кальцію, регулятор кислотності (лимонна кислота), фосфат кальцію, гідроксид калію, гідроксид кальцію, рослинна олія з *Mortierella alpina*, хлорид холіну, L-аскорбат натрію, інозитол, гідроортофосфат магнію, L-гістидин, таурин, L-тирозин, лактат заліза(II), гідроксид натрію, ацетат DL-альфа токоферолу, сульфат цинку, L-карнітин, цитидин-5'-монофосфат, L-аргінін, аденозин-5'-монофосфат, D-пантотенат кальцію, натрієва сіль уридин-5'-монофосфату, натрієва сіль інозин-5'-монофосфату, нікотинамід, глюконат міді, натрієва сіль гуанозин-5'-монофосфату, гідрохлорид тіаміну, рибофлавін, ретинілацетат, гідрохлорид піридоксину, йодид калію, сульфат марганцю(II), фолієва кислота, хлорид хрому(III), фітоменадіон, D-біотин, холекальциферол, селеніт натрію, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

	Одиниці	На 100 мл(ml)
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	418/ 100
Жири, з них:	g (г)	5,4
Насичені	g (г)	3,8
Середньоланцюгові тригліцериди	g (г)	2,8
Мононенасичені	g (г)	0,77
Поліненасичені	g (г)	0,86
- Арахідонова кислота (АК)	mg (мг)	25,2
- Докозагексаєнова кислота (ДГК)	mg (мг)	25,0
Вуглеводи, з них:	g (г)	10,2
Цукри	g (г)	2,7
Лактоза	g (г)	<0,10
Харчові волокна	g (г)	0
Білки	g (г)	2,6
Сіль*	g (г)	0,09

Мінеральні речовини	Одиниці	На 100 мл(ml)
Натрій (Na)	mg (мг)	37,0
Калій (K)	mg (мг)	111,0
Хлориди(Cl)	mg (мг)	75,0
Кальцій (Ca)	mg (мг)	90,0
Фосфор (P)	mg (мг)	45,0
Магній (Mg)	mg (мг)	9,00
Залізо (Fe)	mg (мг)	1,20
Цинк (Zn)	mg (мг)	0,80
Мідь (Cu)	mg (мг)	0,075
Марганець (Mn)	mg (мг)	0,006
Молібден (Mo)	µg (мкг)	6,00
Селен (Se)	µg (мкг)	3,75
Хром (Cr)	µg (мкг)	4,00
Йод (I)	µg (мкг)	19,0

Вітаміни	Одиниці	На 100 мл(ml)
Вітамін А	µg RE (мкг RE)	88,0
Вітамін D3	µg (мкг)	2,40
Вітамін Е	mg α-TE (мг α-TE)	2,10
Альфа-токоферол	mg (мг)	2,70
Вітамін К	µg (мкг)	6,70
Тіамін	mg (мг)	0,15
Рибофлавін	mg (мг)	0,20
Ніацин (преформований)	mg (мг)	0,80
Ніацин (включаючи триптофан)	mg NE (мг NE)	1,67
Пантотенова кислота	mg (мг)	0,80
Вітамін В6	mg (мг)	0,11
Фолієва кислота	µg (мкг)	16,0
Фолати	µg (мкг)	26,7
Вітамін В12	µg (мкг)	0,30
Біотин	µg (мкг)	4,00
Вітамін С	mg (мг)	14,0

Інше	Одиниці	На 100 мл (ml)
L-карнітин	mg (мг)	2,00
Холін	mg (мг)	32,1
Інозитол	mg (мг)	25,0
Таурин	mg (мг)	7,00
Нуклеотиди	mg (мг)	3,60
Осмолярність	mOsmol/l (мОсмоль/л)	295

*Наявність солі зумовлено виключно вмістом натрію природного походження