NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

НЕОКЕЙТ ІНФАНТ

ВІД НАРОДЖЕННЯ

МАСА НЕТТО: 400 g (г) ℮

ОПИС

ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ: ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ НЕОКЕЙТ ІНФАНТ / NEOCATE INFANT ВІД НАРОДЖЕННЯ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Неокейт Інфант / Neocate Infant — суміш суха на основі амінокислот, повноцінна, збагачена довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами. Для дієтотерапії алергії на білок коров'ячого молока у дітей, у випадках полівалентної харчової алергії та інших станів, за яких рекомендовано продукт на основі суміші амінокислот. **Запаковано у захисному середовищі.**

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем. Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Суміш призначена для дітей від народження, якщо вони не вигодовуються грудним молоком. Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. **Продукт необхідно застосовувати тільки за призначенням лікаря, після оцінки всіх можливих видів харчування, включаючи грудне вигодовування.** Може бути використаним в якості єдиного джерела харчування для дітей першого року життя. Не є лікарським засобом. **Не є стерильним.** Необхідно готувати безпосередньо перед годуванням. Не кип'ятити і не використовувати мікрохвильову піч для приготування або розігрівання продукту. Введення інших продуктів у харчування дитини має здійснюватися під наглядом лікаря. Кількість суміші Неокейт Інфант / Neocate Infant може бути зменшено з урахуванням продуктів, введених до раціону дитини.

ВИРОБНИК

«SHS Інтернешнл Лтд.», бул. Ваверті, 100, Вавертрі Технолоджі Парк, Мерсейсайд, Ліверпуль, L7 9PT, Велика Британія.

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна",
вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна,
тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

ДОЗУВАННЯ

Має визначатися лише лікарем.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Строк споживання узгоджується з лікарем.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Запакований продукт зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C). Завжди закривайте банку кришкою після використання. Після першого відкриття щільно закрити кришкою, зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C) та використати протягом 2 тижнів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Порошкоподібна суміш в металевій банці.
Маса нетто: 400 г (g) ℮.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПОЖИВАННЯ

Кількість суміші та її розведення визначається лише лікарем, та залежить від віку, ваги тіла та стану здоров'я дитини.

РЕКОМЕНДОВАНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПРОДУКТУ

Кожна мірна ложка містить приблизно 4,5 г (g) суміші. Додайте одну мірну ложку суміші на кожні 30 мл (ml) води для досягнення рекомендованої концентрації (13,5 об.%).

ЗДОРОВ'Я ВАШОЇ ДИТИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ. ПОРУШЕННЯ СПОСОБУ ПРИГОТУВАННЯ МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ ВАШІЙ ДИТИНІ.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ГОДУВАННЯ З ПЛЯШЕЧКИ

Вік дитини	Добовий об'єм їжі, мл (ml)
0 – 10 днів	70–80 мл (ml) × день життя новонародженого
10 днів – 2 місяці	1/5 маси тіла
2 – 4 місяці	1/6 маси тіла
4 – 6 місяців	1/7 маси тіла
6 – 12 місяців	1/8 – 1/9 маси тіла

1.Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду протягом 5 хвилин, або поки електричний чайник не вимкнеться. Залиште її для охолодження приблизно до +40 °C.
3. Згідно з наведеною вище пропорцією відміряйте точну кількість води та налийте її у простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду.
4. Використовуйте тільки ту мірну ложечку, яка додається. Зніміть надлишки порошку з ложечки тильним боком ножа. Не ущільнюйте!
5. Додайте у воду точну кількість мірних ложечок порошку. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди.
6. Закрийте пляшечку та добре збовтайте її (протягом 10 секунд) до повного розчинення порошку. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (+37 °C).

РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ

Ваш малюк може потребувати менше або більше продукту, ніж це показано в рекомендованій таблиці дозування. Звертайтеся за порадами до лікаря в разі виникнення запитань.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Тривалий або частий контакт напоїв та їжі із зубами збільшує ризик карієсу, тому якісна гігієна ротової порожнини важлива для немовлят та дітей. Слідкуйте за першими зубками малюка, особливо перед сном. При необхідності проконсультуйтесь з вашим лікарем-педіатром або стоматологом.

СКЛАД

Сироп глюкозний сухий, рафіновані рослинні олії (високоолеїнова соняшникова, кокосова, ріпакова, соняшникова), L-аспартат L-аргініну, L-лейцин, ацетат L-лізину, L-глутамін, L-пролін, емульгатор (E472c), L-валін, L-ізолейцин, гліцин, гідроортофосфат калію, L-треонін, L-фенілаланін, L-тирозин, L-серин, L-гістидин, L-аланін, гідроортофосфат кальцію, цитрат калію, хлорид натрію, карбонат кальцію, L-цистин, бітартрат холіну, гліцерофосфат кальцію, L-триптофан, цитрат кальцію, хлорид магнію, L-метіонін, фосфат кальцію, олія з Мортірела алпіна (Mortierella alpina), олія з мікроводоростей Шизохітріум сп. (Schizochytrium sp.), L-аспартат магнію, інозитол, L-аскорбінова кислота, антиоксиданти (соняшниковий лецитин, аскорбілпальмітат), таурин, сульфат заліза (II), сульфат цинку, L-карнітин, ацетат DL-альфа токоферолу, натрієва сіль уридин-5'-монофосфату, цитидин-5'-монофосфат, нікотинамід, D-пантотенат кальцію, натрієва сіль інозин-5'-монофосфату, аденозин-5'-монофосфат, натрієва сіль гуанозин-5'-монофосфату, сульфат міді (II), мононітрат тіаміну, рибофлавін, гідрохлорид піридоксину, ретинілацетат, йодид калію, сульфат марганцю (II), фолієва кислота, фітоменадіон, селеніт натрію, хлорид хрому (III), молібдат натрію, D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін. **Без ГМО.**

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

	Одиниці	На 100 g(г) сухого порошку	На 100 ml(мл)[1] готової суміші
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	2065/ 493	279/ 67
Жири, з них:	g (г)	25,6	3,5
Насичені	g (г)	10,1	1,4
Мононененасичені	g (г)	11,4	1,5
Поліненасичені	g (г)	4,1	0,56
Лінолева кислота (LA)	g (г)	3,33	0,450
α-ліноленова кислота (ALA),	g (г)	0,33	0,0445
- Арахідонова кислота (AA)	mg (мг)	130	17,0
Докозагексаєнова кислота (DHA)	mg (мг)	120	16,7
Вуглеводи, з них:	g (г)	52,7	7,1
Цукри[2]	g (г)	4,6	0,62
Лактоза	g (г)	0	0
Полісахариди	g (г)	46,8	6,3
Харчові волокна	g (г)	0	0
Білковий еквівалент	g (г)	13,3	1,8
Сіль[3]	g (г)	0,53	0,07

Мінеральні речовини	Одиниці	На 100 g(г) сухого порошку	На 100ml(мл)[1] готової суміші
Натрій	mg (мг)	212	28,6
Калій	mg (мг)	536	72,4
Хлориди	mg (мг)	386	52,1
Кальцій	mg (мг)	580	78,3
Фосфор	mg (мг)	370	49,9
Фосфати	mg (мг)	1134	153
Магній	mg (мг)	52,0	7,02
Залізо	mg (мг)	7,39	1,00
Цинк	mg (мг)	5,42	0,73
Мідь	mg (мг)	0,42	0,057
Марганець	mg (мг)	0,049	0,007
Фтор[4]	µg (мкг)	≤44,4	≤5,99
Йод	µg (мкг)	103	14,0
Молібден	µg (мкг)	11,3	1,53
Селен	µg (мкг)	18,7	2,53
Хром	µg (мкг)	10,8	1,46

[1]при розведенні 13,5 г (g) / 100 мл (ml).
[2]не містить лактози та галактози.
[3]зумовлено вмістом натрію природного походження.
[4] можливі відхилення через природний вміст

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Вітаміни	Одиниці	На 100 g(г) сухого порошку	На 100 ml(мл)[1] готової суміші
Вітамін A	µg RE (мкг RE)	431	58,2
Вітамін D3	µg (мкг)	11,8	1,59
Вітамін E	mg α-TE (мг α-TE)	9,85	1,33
Альфа-токоферол	mg (мг)	11,0	1,49
Вітамін K	µg (мкг)	44,7	6,03
Тіамін	mg (мг)	0,59	0,08
Рибофлавін	mg (мг)	0,59	0,08
Ніацин (преформований)	mg (мг)	4,09	0,55
Ніацин (включаючи триптофан)	mg NE (мг NE)	9,41	1,27
Пантотенова кислота	mg (мг)	3,05	0,41
Вітамін B6	mg (мг)	0,48	0,06
Біотин	µg (мкг)	19,2	2,59
Фолієва кислота	µg (мкг)	68,5	9,24
Фолат	µg (мкг)	116	15,7
Вітамін B12	µg (мкг)	1,38	0,19
Вітамін C	mg (мг)	52,7	7,11

Інше	Одиниці	На 100 g(г) сухого порошку	На 100 ml(мл)[1] готової суміші
L-карнітин	mg (мг)	10,8	1,46
Холін	mg (мг)	137	18,5
Інозитол	mg (мг)	110	14,9
Таурин	mg (мг)	32,0	4,32
Нуклеотиди	mg (мг)	17,2	2,33
Осмолярність	mOsmol/l (мОсмоль/л)		310
Осмоляльність	mOsmol/l (мОсмоль/л)		340